

Epidemiologische Untersuchungen zur Prävalenz von ADHS bzw. HKS

Klassifikation	Nr.	Autor	Jahr	Art der Stichprobe	Stichproben- größe	Land	Methode	Alter	Prävalenz
DSM-III	1	August et al.	1998	Population	7.231	USA	Interview	1.-4. Klasse	2,8 %
	2	Lewinsohn et al.	1993	Population	1.710	USA	K-SADS	High school	3,1 %
ICD-9	3	Esser et al.	1990	Population	216	Deutschland	Interview	MW : 8 Jahre	4,2 %
DSM-IV	4	Benjasu- wnatep et al.	2002	Schule	353	Bangkok	Interview, Conners	1.- 6. Klasse	6,5 %
	5	Canino et al.	2004	Repräsentative Stichprobe	1.886	Puerto Rico	Interview	4-17 Jahre	3,8 %
	6	Goodman et al.	2000	Population	7.984	Groß- britannien	DAWBA (Interview & Fragebogen)	MW: 10,2 Jahre	2,4 %

	7	Landgren et al.	1996	Population	589	Schweden	Lehrer-Fragebogen; Teilstichprobe: Interview	MW: 6 Jahre	2,5 - 4 %
	8	Rhode et al.	1999	Population	1.013	Brasilien	Checkliste Interview bei Teilstichprobe	12 -14 Jahre	5,8 %
	9	Wolraich et al.	1998	Kindergarten- und Schulkinder	4.323	USA	Interview	5. Klasse	6,8 %
ICD-10	10	Goodman et al.	2000	Population	7.984	Groß-britannien	DAWBA (Interview & Fragebogen)	MW: 10,2 Jahre	1,4 %
DSM-III-R	11	Fergusson et al.	1993	Geburtskohorte	986	Neuseeland	Eltern-fragebogen	MW: 15 Jahre	3 %
	12	Verhulst et al.	1996	Population	780	Niederlande	Eltern-fragebogen	13-18 Jahre	1,8 %
DSM-IV	13	Pineda et al.	2003	Population	330	Kolumbien	Checkliste	4-17 Jahre	11,5 %